

目の疲れ、充血、かゆみに

エース ロートA

目薬

エースロートAは、5つの成分が目の疲れ、充血、かゆみなどの諸症状にすぐれた効き目をあらわす、キリッとさわやかなさし心地の目薬です。

特長

①目の疲れにすぐれた効果を発揮します。

目の調節神経に直接作用して、ピント調節をスムーズにするメチル硫酸ネオスチグミン、細胞に栄養を与え、新陳代謝を活発にするL-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)の配合で、目の機能回復を助け、目の疲れを改善します。

②充血をすっきり取り除きます。

塩酸ナファゾリンの血管収縮作用によって結膜充血を取り除き、目の炎症を鎮めます。

③眼病を予防し、アレルギーなどによる目のかゆみなどの不快症状を改善します。

水泳のあとやほこり、汗などによる眼病を予防するとともに、抗炎症剤アラントイン、抗ヒスタミン剤マレイン酸クロルフェニラミンの働きで炎症をしずめ、アレルギーなどによる目のかゆみ、充血などの不快症状も改善します。



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人 緑内障

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみ改善されない場合

(3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合


■ 効能

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

■用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼して下さい。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあるので用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。




■成分・分量

有効成分	配合量
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	2%
メチル硫酸ネオスチグミン	0.005%
アラントイン	0.3%
塩酸ナファゾリン	0.003%
マレイン酸クロルフェニラミン	0.02%

○添加物として、ホウ酸、ℓ-メントール、d-カンフル、ベルガモット油、d-ボルネオール、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、
高温の場所(40℃以上)に放置しないで下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用下さい。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってご使用下さい。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないで下さい。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)